

Patientinformation

Kondylom



Foto: Carina Kristiansson

Patientinformation

Kondylom



Foto: Carina Kristiansson

Kondylom

Kondylom eller virusvårtor orsakas av Humant papillom-virus (HPV). Det är den vanligaste sexuellt överförbara infektionen och man kan bli smittad flera gånger med olika virus av samma slag.

Vanligast är att smittan är symtomlös, dvs det vanligaste är att den inte resulterar i vårtor. Det är svårt att skydda sig mot smitta, kondom skyddar också dåligt. Det går alltså inte att skydda sig mot varandra i ett fast förhållande.

Oftast har man inga symtom alls ens om det har bildats synliga vårtor. Någon gång kan de klia lite.

Mycket sällan ger en HPV-infektion upphov till cellförändringar, framför allt på livmodertappen, dessa förändringar upptäcks i allmänhet när man tar cellprov. Det är alltså viktigt att gå och ta cellprov när du blir kallad, från 23 års ålder och fram till du fyller 60.

Av samma anledning är det viktigt att unga kvinnor vaccinerar sig mot HPV.

Behandling

Kondylom försvinner i allmänhet spontant inom ett år.

Det finns medel att behandla bort dem men det kan svida mycket och det har hänt att de gett kroniska skador hos kvinnor. Faktiskt är det så att många fler har blivit skadade av behandlingen för denna åkomma än av själva infektionen!

Processgruppen för vulva-vagina i Västerbotten
Kontaktperson överläkare Inga Sjöberg
inga.sjoberg@vll.se

Kondylom

Kondylom eller virusvårtor orsakas av Humant papillom-virus (HPV). Det är den vanligaste sexuellt överförbara infektionen och man kan bli smittad flera gånger med olika virus av samma slag.

Vanligast är att smittan är symtomlös, dvs det vanligaste är att den inte resulterar i vårtor. Det är svårt att skydda sig mot smitta, kondom skyddar också dåligt. Det går alltså inte att skydda sig mot varandra i ett fast förhållande.

Oftast har man inga symtom alls ens om det har bildats synliga vårtor. Någon gång kan de klia lite.

Mycket sällan ger en HPV-infektion upphov till cellförändringar, framför allt på livmodertappen, dessa förändringar upptäcks i allmänhet när man tar cellprov. Det är alltså viktigt att gå och ta cellprov när du blir kallad, från 23 års ålder och fram till du fyller 60.

Av samma anledning är det viktigt att unga kvinnor vaccinerar sig mot HPV.

Behandling

Kondylom försvinner i allmänhet spontant inom ett år.

Det finns medel att behandla bort dem men det kan svida mycket och det har hänt att de gett kroniska skador hos kvinnor. Faktiskt är det så att många fler har blivit skadade av behandlingen för denna åkomma än av själva infektionen!

Processgruppen för vulva-vagina i Västerbotten
Kontaktperson överläkare Inga Sjöberg
inga.sjoberg@vll.se